



ReXil Agro Malaysia

Biostimulan Terkini 生物营养刺激素 AB YELLOW



- ❖ Menggunakan teknologi terbaru berdasarkan asid silicic
- ❖ 采用最新硅酸提炼技术
- ❖ Produk 100% dari Belanda
- ❖ 荷兰制造&原装进口



REXIL AGRO (M) SDN BHD (1184194-K)

Unit 1A-E, 4th floor, Jalan USJ 10/1A, Taipan Business Centre USJ 10, 47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia



03-8011 9345
011-6321 6383

019-269 2779
010-274 3500

Protokol 操作指南

Bersihkan tong semburan

(Contoh: 20L)

清洗喷洒桶

(以 20 L为例)

Untuk mencapai nilai pH optimum, sila gunakan:

请使用以下中和剂, 中和至理想pH值:

↑ pH: kalium hidroksida (kapur) 氢氧化钾
(石灰)

↓ pH: Asid sitrik 柠檬酸

Isikan air bersih ke dalam tong

将15升清水倒入桶中

Iikut kadar campuran masukan

*AB Yellow

根据剂量指标加入* AB Yellow

Jika perlu, racun perosak dan baja daun boleh dicampurkan

如有所需, 可加入叶面肥/农药

(Kecuali racun rumput 除草剂除外)

Tambahkan baki 5L air ke dalam tong dan kacaukan sehingga sebatи

剩余的 5 L 水倒入桶中, 并再次混合

(Jumlah 20L 共20 L)

Kacau sehingga sebatи

搅拌均匀

Sediakan untuk semburan

可进行喷洒

Semak nilai pH

(pH 5.5-6.5 adalah optimum)

检测酸碱pH值

(理想pH值为5.5 - 6.5)



Kelebihan AB Yellow

使用AB Yellow的好处

- ✓ Sesuai kepada semua tanaman.
适用于所有农作物
- ✓ Selamat & mudah digunakan.
安全且容易使用
- ✓ Tidak merosakan kepada alam sekitar.
对环境友善
- ✓ ↑ 10-35% hasil.
提高产量约 10-35%
- ✓ ↑ Ketahanan terhadap tekanan perosak & cuaca alam.
提高对抗病虫害和恶劣环境的能力
- ✓ ↑ Kualiti, saiz, jangka hayat, kandungan nutrient & gula tanaman.
提高农作物的品质、体积、保质期、营养成分和甜度
- ✓ ↓ Penggunaan racun perosak sebanyak 50%
(Berdasarkan Ujian dengan MARDI).
减少至50%农药使用量(基于MARDI 的科学的研究)
- ✓ ↓ Tekanan air (water stress) kepada tanaman
减少水分逆境对农作物的影响
- ✓ Membantu petani mendapatkan kelulusan myGAP dan GlobalGAP.
符合myGAP和GlobalGAP的良好农业规范认证标准

Tanaman 农作物	Kadar Campuran 参考剂量		Jadual Semburhan 参考施用表	Peringatan 备注
	20 L air 水	1 ha		
1 Padi 稻米	40-80 ml Drone 无人机: 250ml/10L water		4 kali setiap musim 10-14 hari setiap kali 每产季喷洒 4 次 每次间隔10-14天	Semburhan Pertama: tumbuh 3 - 5 helai daun atau 14-21 hari selepas pemindahan
2 Sayur-sayuran 蔬菜		750ml - 1L	4 kali setiap musim 10-14 hari setiap kali 每产季喷洒4次 每次相隔10-14天	Bagi varieti tanaman dengan tempoh penanaman kurang daripada 100 hari, semburhan kedua, ketiga dan keempat boleh dikurangkan kepada 10 hari. 第一次喷洒: 已长出3-5片叶子或移植后14-21天
3 Bunga 花卉	40-80ml			对于种植周期少于100天的品种，第二, 三和四次的喷洒间隔可缩减至10天
4 Buah-buahan 果树	40-80 ml		*** 5 kali setiap musim 14-45 hari setiap kali 每产季喷洒5次 每次间隔14-45天	*** 2 minggu sekali semasa peringkat pertumbuhan Boleh tingkatan dos untuk pokok matang. 在植物生长期, 每两周喷洒一次 成熟的果树可增加用量。



Peringatan 注意事项:

1. Tambahkan atau kurangkan dos dan kekerapan semburhan mengikut jenis tanaman dan kitaran ***
根据作物种类和周期增减喷洒剂量和次数 ***
2. Menggunakan sumber air bersih
使用干净水源
3. Jangan letak botol AB Yellow di kawasan panas
请勿将AB Yellow 瓶放置于高温
4. Waktu Sumburhan: sebelum 9am atau selepas 5pm
建议喷洒时间：早上9点之前或5点以后
5. Mengawal rumput sebelum penggunaan AB Yellow.
在喷洒AB Yellow前，应控制杂草
6. Jangan mencampurkan racun rumput semasa semburhan
请勿混合除草剂一起使用